

GreenHill-Hasennasen

» Thema Impfung «



Gegen welche Krankheiten kann/sollte man Impfen?	<ul style="list-style-type: none">- Myxomatose- RHD 1- RHD 2
Was ist Myxomatose ?	Besonders in Gebieten mit Wildkaninchen sehr verbreitet, tritt wellenartig alle paar Jahre auf. Es gibt akute und milde Verlaufsformen. Die Impfung schützt zu ca. 70-90% vor Symptomen, die restlichen Kaninchen erkranken, teils jedoch deutlich milder. Impfempfehlung für Gebiete mit Wildkaninchenpopulationen oder Futterbezug aus ggf. gefährdeten Gebieten (Heu, Gemüse, Wiese...!).
Was ist RHD1 ?	Auch Chinaseuche genannt, führt innerhalb weniger Tage bei ca. 80% der Kaninchen zum Tod. Die Impfung schützt zuverlässig. Dringende Impfempfehlung.
Was ist RHD2 ?	Mutierte Form der RHD-1, momentan sehr aktiv (ganz Deutschland und mittlerweile auch in Österreich), führt bei ca. 80% der Kaninchen innerhalb von 1-4 Tagen zum Tod (auch Nestlinge!). Die Impfung schützt zuverlässig. Dringend Hauskaninchen impfen.
Wieso impft man sein Kaninchen?	jede der Krankheiten ist erst spät bemerkbar und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zum plötzlichen Tod, ebenso werden alle weiteren Tiere angesteckt, es bleibt nicht bei einem Tier!
Welchen Impfstoff nimmt man?	wenn das Tier noch nicht geimpft wurde, ist „Nobivac Myxo RHD PLUS“ die beste Wahl. Dieser deckt alle 3 Krankheiten ab, ist nur 1 Stich und muss bloß jährlich aufgefrischt werden.
Inkubationszeit? Wann merke ich die Krankheit? Ab wann sind meine Tiere durch die Impfung geschützt?	von der Ansteckung bis zum Ausbruch dauert es in der Regel nur 1-3 Tage Beginn der Immunität ist bei Nobivac Myxo RHD PLUS bei 3 Wochen.

GreenHill-Hasennasen

» Thema Impfung «



Wie bekommt mein Kaninchen die Krankheiten überhaupt?

Übertragbar sind diese durch alle möglichen Überträger, welche jemals in der Natur waren. Folgende Beispiele:

- Frischfutter (Wiese/Gemüse/Äste/...)
- Heu (kommt ebenso aus der Natur)
- Tierarztbesuche
- Kleidung (Schuhe/Hose/...)
- Mücken/Fliegen/Zecken/Insekten
- ...

ACHTUNG: auch im Winter!!!!

Tiere in Innenhaltung müssen auch geimpft werden?
„Die sind ja eh nie im Garten.“

JA! Denn auch diese Tiere bekommen Gemüse vom Feld, Wiese oder beschnüffeln die Schuhe der Besitzer. Ebenso ist jedes Heu vom Feld.

Wie gut schützt die Impfung mein Tier?

Tiere, welche geimpft sind, haben eine wesentlich höhere Chance zu überleben. Wenn sie überhaupt erkranken, dann meist in einem milderem Verlauf, wodurch ein Tierarzt ihnen noch das Leben retten kann! Schnell Handeln ist wichtig!!!

Kann man einfach so impfen?

Ja, der Tierarzt sollte kaninchenkundig sein & sich die Tiere vor der Impfung genau ansehen und die Gesundheit überprüfen. Kranke Tiere sollten nicht geimpft werden!

Im Idealfall vor der Impfung eine Kotprobe auf Darmparasiten testen lassen!

Kotprobe? Wie geht das?

Hierbei wird frisch ausgemistet & anschließend an 3 Tagen hintereinander Kot der gesamten Gruppe gesammelt. Es sollte aus verschiedenen Toiletten-Ecken genommen werden. Diese in einem Behälter sammeln & beim Tierarzt zur Überprüfung auf Darmparasiten abgeben. Nach wenigen Tagen bekommt man die Ergebnisse. Sollten diese positiv auf Darmparasiten sein, werden die Tiere zuerst dahingehend behandelt & anschließend erst geimpft. (= bessere Wirksamkeit & Verträglichkeit)

GreenHill-Hasennasen

» Thema Impfung «



Hat mein Kaninchen optimalen Schutz? Unterschiedliche Möglichkeiten zu impfen			
Krankheiten:	RHD-2	RHD-1	Myxomatose
Möglichkeit 1	Nobivac Myxo-RHD PLUS (jährlich)		
Möglichkeit 2	Filavac (je nach Seuchenlage: halbjährlich/jährlich)		RIKA-VACC Myxo (halbjährlich + bei Erstimpfung Grundimmunisierung!*), In Myxomatose-Seuchengebieten ggf. alle vier Monate auffrischen.
Möglichkeit 3	Eravac (halbjährlich)	RIKA - VACC Duo (halbjährlich + bei Erstimpfung Grundimmunisierung!*)	
Möglichkeit 4	Eravac (halbjährlich)	RIKA-VACC RHD (jährlich + bei Erstimpfung Grundimmunisierung!*)	RIKA-VACC Myxo (halbjährlich + bei Erstimpfung Grundimmunisierung!*), In Myxomatose-Seuchengebieten ggf. alle vier Monate auffrischen.

***Grundimmunisierung:** Zwei aufeinander folgende Impfungen (Abstand nach Packungsbeilage) bei erstmals oder länger nicht geimpften Kaninchen.

Umstellung auf Nobivac Myxo-RHD PLUS®		
Aktueller Impfstatus		Impfung zur Umstellung
Ungeimpft		Nobivac Myxo-RHD PLUS®
Nur gegen Myxomatose geimpft oder ungeimpft an Myxomatose erkrankt (Feldinfektion)		Nobivac Myxo-RHD PLUS® und ein Impfstoff gegen RHD1 und RHD2 (z.B. Filavac) Folgeimpfung nach einem Jahr: Nobivac Myxo-RHD PLUS®
Gegen Myxomatose und RHD1 geimpft (z.B. Nobivac Myxo-RHD)		Nobivac Myxo-RHD PLUS® und ein Impfstoff gegen RHD2 (z.B. Filavac) Folgeimpfung nach einem Jahr: Nobivac Myxo-RHD PLUS®
Gegen Myxomatose, RHD1 und RHD2 geimpft (z.B. Nobivac Myxo-RHD + Filavac)		Nobivac Myxo-RHD PLUS®
Nur gegen RHD1/RHD2 geimpft (z.B. Filavac)		Nobivac Myxo-RHD PLUS®

Grafik Nach Herstellerempfehlung

→ weitere Infos auf www.kaninchenwiese.de